

Datum: _____
Kur: _____
Yta: _____

Patientdata

CEOP

Indikation: Patienter som pga hjärtskada inte bedöms klara doxorubicin

Inf Vincristin	1.4 mg/m ² (max 2 mg)	Dag 1
Inf Cyklofosfamid	750 mg/m ²	Dag 1
Inj Etoposid fosfat	50 mg/m ² *	Dag 1
K Etoposid	100 mg/m ² *	Dag 2-3
T Deltison	50 mg/m ²	Dag 1-5

* vid lågt S-Albumin <30 g/L reduceras Etoposiddosen till 75 %

Inför varje kur: Blodstatus, Neutr.
Cykelintervall: 21 dagar.
Efter kur: Antiemetikaschema nr 1.

DAG 1	beställs till kl _____ avvakta ja nej	Ssk.sign	Läk.sign
Inj Ondansetron 8 mg iv		_____	_____
Inj Betapred 8 mg iv		_____	_____
T Deltison _____ mg po		_____	_____
Inf Vincristin _____ mg iv i 100 ml NaCl, inf.tid 5 min		_____	_____
Inf Cyklofosfamid _____ mg iv i 100 ml NaCl. Inf tid 10-15 min		_____	_____
Inj Etoposid fosfat _____ mg iv bolus Inj tid 5-10 min		_____	_____

DAG 2		Ssk.sign	Läk.sign
T Ondansetron 8 mg po		_____	_____
T Deltison _____ mg po		_____	_____
K Etoposid _____ mg po		_____	_____

DAG 3		Ssk.sign	Läk.sign
T Ondansetron 8 mg po		_____	_____
T Deltison _____ mg po		_____	_____
K Etoposid _____ mg po		_____	_____

DAG 4		Ssk.sign	Läk.sign
T Deltison _____ mg po		_____	_____

DAG 5		Ssk.sign	Läk.sign
T Deltison _____ mg po		_____	_____

Godkänd av: _____ Läkarens underskrift: _____