

Datum: _____
Kur: _____
Yta: _____

Patientdata:

FC (fludara/cyklofosamid)

(Lymfom)

T Cyklofosamid 50 mg/tabli	250 mg/m ²	Dag 1-3
T Fludara 10 mg/tabli	40 mg/m ²	Dag 1-3

Inför kur 1: Blodstatus, Neutr, Krea, Cystatin-C (enbart första kuren).

Inför varje kur: Blodstatus, Neutr, Krea.

OBS! Tablettorna skall tas på morgonen, minst 30 min före måltid!

Vid nedsatt njurfunktion skall dosreduktion ske enl. schema

Cykelintervall: 28 dagar.

Efter kur: Antiemetikaschema nr 1.

DAG 1

Ssk.sign Läk.sign

T Ondansetron 8 mg

T Deltison 50 mg po

T Cyklofosamid (Sendoxan) (50 mg) totalt _____ mg po

T Fludara (10 mg) totalt _____ mg po

DAG 2

Ssk.sign Läk.sign

T Ondansetron 8 mg

T Deltison 50 mg po

T Cyklofosamid (Sendoxan) (50 mg) totalt _____ mg po

T Fludara (10 mg) totalt _____ mg po

DAG 3

Ssk.sign Läk.sign

T Ondansetron 8 mg

T Deltison 50 mg po

T Cyklofosamid (Sendoxan) (50 mg) totalt _____ mg po

T Fludara (10 mg) totalt _____ mg po

Godkänd av: _____ Läkarens underskrift: _____