

Datum: \_\_\_\_\_  
Vikt: \_\_\_\_\_

Patientdata:

## **Brentuximab-vedotin**

CD 30 + Lymfom

Inf Brentuximab-vedotin (Adcetris) 1,8 mg/kg, max 180 mg. Dag 1

**Inför varje kur:** Blodstatus, Na, K, Krea, leverstatus

**Cykelintervall:** 21 dagar.

**Om reaktion vid första infusionen:** Paracetamol 1 g po, Ondansetron 8 mg iv, Betapred 4 mg iv, ges 30-60 min före följande infusioner

**DAG 1** beställs till kl \_\_\_\_\_ avvakta ja \*

**Ssk.sign Läk.sign**

**\*Får inte blandas innan patienten anlänt.**

**Ingen premedicinering** (Om reaktion kur 1, se ovan)

**Tim 0** kl \_\_\_\_\_ Bltr \_\_\_\_\_ Puls \_\_\_\_\_

**Inf Brentuximab** \_\_\_\_\_ mg i 150 ml NaCl. Inf.tid 30 min.

Start \_\_\_\_\_  
Stopp \_\_\_\_\_

Bltr kontroll +15 min kl \_\_\_\_\_ Bltr \_\_\_\_\_ Puls \_\_\_\_\_

Bltr kontroll +30 min kl \_\_\_\_\_ Bltr \_\_\_\_\_ Puls \_\_\_\_\_

Bltr kontroll +60 min kl \_\_\_\_\_ Bltr \_\_\_\_\_ Puls \_\_\_\_\_

Godkänd av: \_\_\_\_\_ Läkarens underskrift: \_\_\_\_\_