

## Caelyx/Gemcitabin

Recidivbehandling (Lymfom)

Caelyx	30 mg/m <sup>2</sup>	iv inf 1 tim	Dag 1
Gemcitabin	800 mg/m <sup>2</sup>	iv inf 30 min	Dag 1, 8

Före behandling: Blodstatus, Neutr.  
Premedicinering enligt cytostatikaschema.  
Efter kur: Antiemetikaschema nr 1.  
Cykelintervall 21 dagar.

OBS!! Dosreduktion får ej ske om provsvar äldre än 24 timmar.

Dosreduktion:

B-Neutrofiler (x10 <sup>9</sup> /L)	B-TPK (x10 <sup>9</sup> /L)	Caelyx	Gemcitabin
>1,0	>100	100%	100%
1,0-0,5	99-75	75%	75%
<0,5	<50	Beh. uppskjutes en vecka	Beh uppskjutes en vecka

**För att minska risken för akuta infusionsreaktioner skall kur 1 med Caelyx ges enligt följande:**

Starta infusionen med hastigheten 50 ml/timme under de första 15 minuterna. Om ingen reaktion uppträder ökas infusionshastigheten sedan under påföljande 15 min till den dubbla. Om ingen reaktion uppträtt under de första 30 minuterna ges resterande mängd infusion med ordinarie hastighet.

**Behandling vid en allergisk reaktion orsakat av Caelyx – se lokala instruktioner!**