

CHOEP-14 (Lymfom)

Vinkristin	1.4 mg/m ² (max 2.0 mg)	iv inf 5 min	Dag 1
Cyklofosamid	750 mg/m ²	iv inf 10-15 min	Dag 1
Doxorubicin	50 mg/m ²	iv inf 30 min	Dag 1
Etoposid fosfat	100 mg/m ² *	iv inj 5-10 min	Dag 1
Etoposid	200 mg/m ² *	kapsel	Dag 2 och 3
Deltison	50 mg/m ²	tablett	Dag 1-5
Inj G-CSF	300 µ /30 ME < 70 kg 480 µ /48 ME > 70 kg	sc inj	Dag 4 tom 11 (=8 dagar)
Alt inj Neulasta	6 mg	sc inj	Dag 4
Pneumocystis profylax: T Eusaprim Forte 1 tabl, 1 ggr dagligen. Mån, ons och fre			

***Vid lågt S-albumin <30 g/L reduceras Etoposiddosen till 75%**

Inför varje kur: Blodstatus, Neutr.
Premedicinering enligt cytostatikaschema.
Cykelintervall 14 dagar.
Efter kur: Antiemetikaschema nr 1.

OBS!! Dosreduktion får ej ske om provsvar äldre än 24 timmar.

Dosreduktion för cyklofosamid, doxorubicin, etoposid:

Neutrofiler (x10 ⁹ /L)	B-TPK (x10 ⁹ /L)	
≥ 0.5	≥ 75	100%
≥ 0.2 men < 0.5	50 till < 75	75%
< 0.2	< 50	Beh uppskjutes 3-7 dagar