

Hyper-CVAD (kur 1, 3, 5 och 7) (Lymfom)

| | | | |
|-------------------------|--|---------------------|-----------------------------------|
| Cyklofosamid | 600 mg/m ² totaldos /dag | iv inf 3 tim x 2 | Dag 1-3 |
| Uromitexan | 60 mg/m ² | iv inj bolus tim 0 | Dag 1-3 |
| Uromitexan | 400 mg | tablett tim 2 och 6 | Dag 1-3 tim 2 och 6 |
| Methotrexat | 12.5 mg | i.t | Dag 1 |
| Doxorubicin | 50 mg/m ² | iv inf 30 min | Dag 4 |
| Betapred | 20 mg/m ² | tablett | Dag 1-4, 11-14 |
| Vinkristin | 2 mg | iv inf 5 min | Dag 4 och 11 |
| Inj G-CSF | 300 µ / 30 ME < 70 kg } 480 µ / 48 ME > 70 kg } | sc inj | Dag 5 tom 12 (=8 dagar) |
| Alt inj Neulasta | 6 mg | sc inj | Dag 5, 24 tim efter avslutat cyto |

Inför varje kur: Blodstatus, Neutr.
 Premedicinering enligt cytostatikaschema.
 Cykelintervall 14 dagar.
 Efter kur: Antiemetikaschema nr 1.

OBS!! Dosreduktion får ej ske om provsvar äldre än 24 timmar.

Dosreduktion för cyklofosamid, doxorubicin:

| Neutrofiler (x10⁹/L) | B-TPK (x10⁹/L) | |
|--|----------------------------------|--------------------------|
| ≥ 0.5 | ≥ 75 | 100% |
| ≥ 0.2 men < 0.5 | 50 till < 75 | 75% |
| < 0.2 | < 50 | Beh uppskjutes 3-7 dagar |