

Singel MTX CNS-PROFYLAX (Lymfom)

Natriumbikarbonat	2 g x 4/dag	po tablett	Dag 0, 1, 2, 3
Methotrexat	3000 mg/m ² 2 tim < 60 år	Iv inf 2 tim	Dag 1
Methotrexat	1500 mg/m ² 2 tim 60-65 år	Iv inf 2 tim	Dag 1
Kalciumfolinat	15 mg	Start 24 tim efter avslutad Mtx inf	

Inför varje kur: Blodstatus, Neutr.
Premedicinering enligt cytostatikaschema.

Mtx koncentration tim (efter Mtx start) 2, 26, 50, 62, 74.

Kalciumfolinat 15 mg po/iv ges var sjätte timme tills Mtx konc <0.2µmol/L och därefter ytterligare 4 gånger.

T Natriumbikarbonat 2 g x 4 i fyra dagar.

Urin pH vid varje miktionstillfälle. Om U-pH <6 ge Inf Natriumbikarbonat 100 ml iv.
Använd separat lista.

Blodstatus dag 8, 10 och 12.
Efter kur: Antiemetikaschema nr 3.

OBS!! Dosreduktion får ej ske om provsvar äldre än 24 timmar.

Dosreduktion

Neutrofiler (x10⁹/L)	B-TPK (x10⁹/L)	Methotrexat
< 1,0	< 75	Beh uppskjutes