

Datum: \_\_\_\_\_  
Kur: \_\_\_\_\_  
Yta: \_\_\_\_\_

Patientdata:

## Rituximab ensamt

Inf Rituximab (Kur 1)	375 mg/ m <sup>2</sup> (avrunda till närmsta 100-tal uppåt)	Dag 1
Inj Rituximab sc (From Kur 2)	1400 mg standarddos	Oftast dag 8, 15, 22 eller Alt. underhåll var 2-3 mån

### Riktlinjer hur man ger rituximab

#### **Första infusion:**

Starta med 50 mg/h. Därefter ökning med 50 mg/h var 30:onde minut till max 400 mg/h.

Tavegyl ges profylaktiskt alltid vid första infusionen.

BT/puls vid start och därefter vid symtom.

Om läkemedelsreaktion - stoppa droppet tills reaktionen klingat av. Vid återupptagning av behandling välj den dropphastighet som pågick vid start av reaktion.

**Cykelintervall:** Bestäms utifrån diagnos. Se journal.

#### **Följande behandlingar (om första behandlingen var utan allvarliga infusionsreaktioner):**

1400 mg sc inj (fast dos) som ges under 5 min.

Tavegyl ges inte som rutin.

**DAG 1** beställs till kl \_\_\_\_\_ avvakta ja nej **Ssk.sign Läk.sign**

#### **Kur 1:**

T/Inj Betapred 8 mg po/iv }  
T/Inj Tavegyl 2 mg po/iv } po ges 60 min /iv ges 30 min innan start av rituximab \_\_\_\_\_

Inf Rituximab \_\_\_\_\_ mg iv i 500 ml NaCl  
Start \_\_\_\_\_  
Stopp \_\_\_\_\_

#### **Följande kurer:**

T. Betapred 4 mg ( 8 tabletter 0,5 mg ) }  
Inj Rituximab **1400 mg sc inj 5 min** } \_\_\_\_\_

BT / puls vid Rituximabinfusion KUR 1

<u>Kl</u>	<u>mg/h</u>	<u>ml/h</u>	<u>Blodtryck</u>	<u>Puls</u>	<u>Obs</u>	<u>Sign</u>

Godkänd av: \_\_\_\_\_ Läkarens underskrift: \_\_\_\_\_