

Datum: _____
Kur: _____
Yta: _____

Patientdata:

Rituximab tillsammans med cytostatika

+ _____

Inf Rituximab (Kur 1))	375 mg/ m ² (avrunda till närmsta 100-tal uppåt)	Dag 1
Inj Rituximab sc (From Kur 2)	1400 mg standarddos	Dag 1

Inför kur ta: Blodstatus, Neutr.
Cykelintervall: 14 eller 21 dagar.

Riktlinjer hur man ger rituximab

Första infusion:

Starta med 50 mg/h. Därefter ökning med 50 mg/h var 30:onde minut till max 400 mg/h.

Tavegyl ges profylaktiskt alltid vid första infusionen.

BT/puls vid start och därefter vid symtom.

Om läkemedelsreaktion - stoppa droppet tills reaktionen klingat av. Vid återupptagning av behandling välj den dropphastighet som pågick vid start av reaktion.

Följande behandlingar (om första behandlingen var utan allvarliga infusionsreaktioner):

1400 mg sc inj (fast dos) som ges under 5 min.

Tavegyl ges inte som rutin.

DAG 1 beställs till kl _____ avvakta ja nej

Ssk.sign **Läk.sign**

Kur 1:

Antiemetika po ges 60 min /iv ges 30 min innan start av rituximab:

T/Inj Betapred 4 mg po/iv

(ges ej om det redan finns i konkomittant cytostatikabehandling)

T/Inj Tavegyl 2 mg po/iv

Inf Rituximab _____ mg iv i 500 ml NaCl.

Start

Stopp

Kur 2 och följande kurer:

T/Inj Betapred 4 mg po/iv

Inj Rituximab **1400 mg sc** Inj 5 min

BT / puls vid Rituximabinfusion KUR 1

<u>Kl</u>	<u>mg/h</u>	<u>ml/h</u>	<u>Blodtryck</u>	<u>Puls</u>	<u>Obs</u>	<u>Sign</u>

Godkänd av: _____ Läkarens underskrift: _____