

Datum: _____
Kur: _____
Yta: _____

Patientdata

Stamcellsmobilisering med Cyklofosamid

(Myelom)

Inf Cyklofosamid	2000 mg/m ²	Dag 1
Inj Uromitexan	800 mg/m ²	Dag 1, Tim 0, 3, 6 och 9
Inj G-CSF	5 µg/kg alt 0,5 ME/kg x 1 (morgondos)	Dag 6 tills skörd är klar

Inför kur: Blodstatus, Neutr.

Nya prover räcker oftast att ta inför blodstamcellsskörd.

Efter kur: Antiemetikaschema nr 4b. *Skrivs ut samtidigt som flödesschemat, blad 3.*

Ge rikligt med dryck!

Vätskedrivande ska ges i samband med Cyklofosamidstarten.

G-CSF- C-länspat. ska få med förfyllda sprutor för sex dagars behandling

DAG 1 beställs till kl _____ avvakta ja nej **Ssk.sign Läk.sign**

T Ondansetron 8 mg po _____

T Betapred 6 mg po _____

T. Furosemid 40 mg. Ges samtidigt vid start av cyklofosamid. _____

Inf Cyklofosamid _____ mg iv i 500 ml NaCl. Inf.tid 1 tim _____

Start _____

Stopp _____

Uromitexan ges strax före Cyklofosamidstart:

Tim 0 kl _____ **Inj Uromitexan** _____ mg iv bolus Inj.tid 3-5 min _____

Tim 3 kl _____ **Inj Uromitexan** i v _____

Tim 6 kl _____ **Inj Uromitexan** i v _____

Tim 9 kl _____ **Inj Uromitexan** i v _____

Inf Ringer acetat. Inf tid 12 tim _____

Start _____

Stopp _____

Inf Ringer acetat. Inf tid 12 tim _____

Start _____

Stopp _____

Se till att patienten får rikligt med dryck

DAG 6 tills skörd är klar OBS! Ordination för flera dagar!!

Ssk.sign

Läk.sign

Start av Inj G-CSF sc Dela upp totaldosen på : } _____ antal sprutor 300 µg /30 ME
(5 µg/kg alt 0,5 ME/kg x 1) } _____ antal sprutor 480 µg /48 ME

Godkänt av: _____ Läkarens underskrift: _____

ANTIEMETIKA SCHEMA NR 4b VID FÖRDRÖJT ILLAMÅENDE

På behandlingsdagen får du läkemedel mot illamående av den behandlande sjuksköterskan innan cytostatikabehandlingen påbörjas. Dagen efter behandlingen tar du enligt nedan:

Behandlingens datum _____

<u>Datum</u>	<u>Dag</u>	Tablett Betapred 0.5 mg
_____	1	8 st
_____	2	6 st
_____	3	4 st
_____	4	2 st
_____	5	1 st

Dessa Betapred tabletter löser du upp i vatten.

Skölj gärna munnen efter intag av Betapred för att minska risken för munsvamp.

Vid eventuellt illamående trots behandling enligt ovan tag då tablett Primperan, max 30 mg per dag, dvs 3 tabletter.

Om du fortfarande är illamående så kontakta den avdelning där du får din behandling.