

Datum: _____

Patientdata

Kur: _____

Yta: _____

Vikt: _____ kg

Bevacizumab

(Bröstca.)

| | | |
|------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Inf Bevacizumab (Avastin) | 10 mg/kg <input type="checkbox"/> | Dag 1 varannan vecka |
| eller Inf Bevacizumab | 15 mg/kg <input type="checkbox"/> | Dag 1 var 3:e vecka |

Inför varje kur: Blodstatus, Neutr.

Ta urinsticka dagen före eller samma dag som kur, om proteinuri (>+1) avvakta med inf Bevacizumab och kontakta läkare! Vg se under fliken kontrollschema vid proteinuri vid Bevacizumab behandling.

Om blodtrycket > 150/90 avvakta med inf Bevacizumab och kontakta läkare!

Ge inf Bevacizumab nr 1 på 90 min, om det går bra; ge inf nr 2 på 60 min, om det går bra; ge fortsatta infusioner på 30 min.

Ge första infusionen före cytostatika, resterande infusioner kan ges före eller efter.

OBS! Risk för gastrointestinal perforation, sämre sårhelingsprocess.

Cykelintervall: 14 eller 21 dagar.

Efter kur: Antiemetikaschema nr 1.

DAG 1

beställs till kl _____ avvakta ja nej

Ssk.sign

Läk.sign

BT _____ P _____ U-protein _____

Inf Bevacizumab _____ mg iv i 100 ml NaCl , inf.tid 90/60/30 min

Start _____

Stopp _____

Godkänt av: _____ Läkarens underskrift: _____