

Bevacizumab (bröstca)

Bevacizumab (Avastin)	10 mg/kg	cykelintervall 14 dagar <input type="checkbox"/>	iv inf 90/60/30 min	Dag 1
Eller Bevacizumab	15 mg/kg	cykelintervall 21 dagar <input type="checkbox"/>	iv inf 90/60/30 min	Dag 1

Ges ej ensamt vid bröstcancer!

Inför varje kur: Blodstatus, neutr.

Ta urinsticka dagen före eller samma dag som kur, om proteinuri (>+1) avvakta med inf Bevacizumab och kontakta läkare! Vg se under fliken kontrollschema vid proteinuri vid Bevacizumab behandling.

Om blodtrycket > 150/90 avvakta med inf Bevacizumab och kontakta läkare!

Ge inf Bevacizumab nr 1 på 90 min, om det går bra; ge inf nr 2 på 60 min, om det går bra; ge fortsatta infusioner på 30 min.

Bevacizumab kan ges före eller efter cytotatikabehandlingen.

OBS! Risk för gastrointestinal perforation, sämre sårhelingsprocess (minst 5 veckors uppehåll till planerad operation).

Cykelintervall 14 eller 21 dagar.
Efter kur: Antiemetikaschema nr 1.

Ingen dosreduktion för Bevacizumab.