

EC 75 (adjuvant bröstcancer)

Epirubicin	75 mg/m ²	iv inf 1 tim	Dag 1
Cyklofosamid	600 mg/m ²	iv inf 15 min	Dag 1

Inför varje kur: Blodstatus, Neutr.

Vid metastaserad bröstcancer även: Leverstatus och CA 15-3.

Mellanprov: Blodstatus dag 12.

Premedicinering enligt cytostatikaschema.

Cykelintervall 21 dagar.

Utvärderingsintervall: var sjätte till nionde vecka.

Efter kur: Antiemetikaschema nr 6.

Uppmana patienten att dricka rikligt med vätska inför behandlingen, om möjligt 1 L.

OBS! Lever och hjärtfunktion. Om högt bilirubin, dosreducera.

Dosreduktion:

Om LPK < 2.5 alternativt TPK < 75 vid provtagning dag 21 eller 22 skall behandlingen skjutas upp till dessa värden uppnåtts.

Om kuren uppskjuts > 2 veckor skall dosreduktion ske för efterföljande kur. Reducera till EC 60.

Om LPK < 1.0, uppmäts under mellanperioden, så bör man överväga en dosreduktion för efterföljande kurer. I första hand görs en reduktion till EC 60.

Patienter med nedsatt leverfunktion:

Vid bilirubin 26-50 µmol/L ge 75% av dos cykel 1, vid bilirubin > 50 µmol/L ge 50% av dos cykel 1.