

## EC 90 (adjuvant bröstcancer)

<b>Epirubicin</b>	90 mg/m <sup>2</sup>	iv inf 1 tim	Dag 1
<b>Cyklofosfamid</b>	600 mg/m <sup>2</sup>	iv inf 15 min	Dag 1
<b>G-CSF</b>	300 µg/30 ME till patienter < 70 kg 480 µg/48 ME till patienter > 70 kg	sc inj	Dag 4 -11

Inför varje kur: Blodstatus, Neutr.  
Mellanprov: Blodstatus dag 12.  
Premedicinering enligt cytostatikaschema.

Cykelintervall 21 dagar.  
Utvärderingsintervall: var sjätte till nionde vecka.

Efter kur: Antiemetikaschema nr 6.

Uppmana patienten att dricka rikligt med vätska inför behandlingen, om möjligt 1 liter.

OBS! Lever och hjärtfunktion. Om högt bilirubin, dosreducera.

### **Dosreduktion:**

Om LPK < 2.5 alternativt TPK < 75 vid provtagning dag 21 eller 22 skall behandlingen skjutas upp till dessa värden uppnåtts.

Om kuren uppskjuts > 2 veckor skall dosreduktion ske för efterföljande kurer. Reducera till EC 75.

Om LPK < 1.0 uppmäts under mellanperioden, så skall dosreduktion övervägas för efterföljande kurer. I första hand gör en reduktion till EC 75.

### **Patienter med nedsatt leverfunktion:**

Vid bilirubin 26-50 µmol/L ge 75% av dos cykel 1, vid bilirubin > 50 µmol/L ge 50% av dos cykel 1.