

Epirubicin/Docetaxel (Taxotere) (bröstca) Ej studie

Epirubicin	90 mg/m ²	iv inf 1 tim	Dag 1
Docetaxel	75 mg/m ²	iv inf 1 tim	Dag 1
G-CSF	300 µg/30 ME till patienter < 70 kg 480 µg/48 ME till patienter > 70 kg	sc inj	Dag 4 -11

Endast inför kur 1: ASAT, ALAT, Bilirubin.

Inför varje kur: Blodstatus, Neutr.

Mellanprov: Blodstatus, Neutrofila dag 12.

Premedicinering enligt cytostatikaschema.

Kur 1-2: Pat övervakas avseende överkänslighetsreaktioner med upprepade kontroller av blodtryck, puls och AT.

Cykelintervall 21 dagar.

Utvärderingsintervall: var sjätte till nionde vecka.

Efter kur: Antiemetikaschema nr 6.

OBS! Lever och hjärtfunktion.

Dosreduktion:

LPK < 2,5 (neutrofila < 1,5) alternativt TPK < 100 vid provtagning dag 21 eller 22, skall behandlingen uppskjutas en vecka eller till dess dessa värden uppnåtts.

Dosreducerande kurer ges med:

Epirubicin 70 mg/m² och Docetaxel 60 mg/m² dag 1.