

FEC 60 (Vid adjuvant/metastaserad bröstcancer)

Epirubicin	60 mg/m ²	iv inf 1 tim	Dag 1
5-Fluorouracil	600 mg/m ²	iv bolus 2-5 min	Dag 1
Cyklofosfamid	600 mg/m ²	iv inf 15 min	Dag 1

Inför varje kur: Blodstatus, Neutr.

Mellanprov: Blodstatus dag 12.

Vid metastaserad bröstcancer även: Leverstatus och CA 15-3.

Premedicinering enligt cytostatikaschema.

Cykelintervall 21 dagar.

Utvärderingsintervall: var sjätte till nionde vecka.

Efter kur: Antiemetikaschema nr 4 för äldre patienter och nr 6 för patienter <50 år.

Uppmana patienten att dricka rikligt med vätska inför behandlingen, om möjligt 1 liter.

OBS! Lever och hjärtfunktion. Om högt bilirubin, dosreducera.

Dosreduktion:

Om LPK < 2.5 alternativt TPK < 75 vid provtagning dag 21 eller 22 skall behandlingen skjutas upp till dessa värden uppnåtts.

Om kuren uppskjuts > 2 veckor skall dosreduktion med 20% ske för efterföljande kur.

Om LPK < 1.0 uppmäts under mellanperioden, så bör dosreduktion med 20% övervägas för efterföljande kur.

Patienter med nedsatt leverfunktion:

Vid bilirubin 26-50 µmol/L ge 75% av dos cykel 1, vid bilirubin > 50 µmol/L ge 50% av dos cykel 1.