

Datum: _____

Patientdata

Kur: _____

Yta: _____

FEC 75

(Bröstca.)

Inf Epirubicin	75 mg/m ²	Dag 1
Inj 5-FU	600 mg/m ²	Dag 1
Inf Cyklofosamid	600 mg/m ²	Dag 1

Inför varje kur: Blodstatus, Neutr.
Vid metastaserad bröstcancer även: Leverstatus och CA 15-3.
Mellanprov: Blodstatus dag 12 (nadir).
OBS! Lever och hjärtfunktion. Om högt bilirubin, dosreducera.
Cykelintervall: 21 dagar.
Efter kur: Antiemetikaschema nr 6.
Uppmana patienten att dricka rikligt med vätska inför behandlingen, om möjligt 1 L.

DAG 1 beställs till kl _____ avvakta ja nej **Ssk.sign** **Läk.sign**

Po. tas 1 tim före behandling			
K Emend 125 mg po 1 timme före behandling		_____	_____
<i>Ge endast en av nedanstående antiemetika</i>	} patient < 50 år		
T Palonosetron (Aloxi) 500 µg po (alt iv, enl nedan)		_____	_____
Inj Palonosetron (Aloxi) 250µg iv			
<i>eller</i>	} patient > 50 år		
T/Inj Ondansetron 8 mg po/iv		_____	_____
T/Inj Betapred 8 mg po/iv		_____	_____
Inf Epirubicin _____ mg iv i 500 ml NaCl. Inf.tid 1 tim		_____	_____
		Start	
		Stopp	
Inj 5-FU _____ mg iv bolus. Inj.tid 2-5 min		_____	_____
Inf Cyklofosamid _____ mg iv i 250 ml NaCl. Inf.tid 15 min		_____	_____
		Start	
		Stopp	

Peroral profylax**Ssk.sign****Antiemetikaschema nr 6.**

Godkänt av: _____ Läkarens underskrift: _____