

FEC 100

(adjuvant bröstcancer)

Epirubicin	100 mg/m ²	iv inf 1 tim	Dag 1
5-Fluorouracil	500 mg/m ²	iv bolus 2 -5 min	Dag 1
Cyklofosamid	500 mg/m ²	iv inf 15 min	Dag 1
G-CSF	300 µ /30 ME till patienter < 70 kg 480 µ /48 ME till patienter > 70 kg	sc inj	Dag 4 -11

Inför varje kur: Blodstatus, Neutr.

Mellanprov: Blodstatus dag 12.

Premedicinering enligt cytostatikaschema.

Cykelintervall 21 dagar.

Utvärderingsintervall: var sjätte till nionde vecka.

Efter kur: Antiemetikaschema nr 6.

Uppmana patienten att dricka rikligt med vätska inför behandlingen, om möjligt 1 liter.

OBS! Lever och hjärtfunktion. Om högt bilirubin, dosreducera.

Dosreduktion: Om LPK < 2.5 alternativt TPK < 75 vid provtagning dag 21 eller 22 skall behandlingen skjutas upp till dessa värden uppnåtts.

Om kuren uppskjuts > 2 veckor skall dosreduktion ske för efterföljande kurer. Reducera till FEC 75.

Om LPK < 1.0 uppmäts under mellanperioden, så skall dosreduktion övervägas för efterföljande kurer.

I första hand gör en reduktion till FEC 75.

Patienter med nedsatt leverfunktion:

Vid bilirubin 26-50 µmol/L ge 75% av dos cykel 1, vid bilirubin > 50 µmol/L ge 50% av dos cykel 1.