

Datum: _____

Patientdata

Kur: _____

Vikt: _____

Kadcyla (trastuzumab emtansine)

Inf Kadcyla	<input type="checkbox"/> 3,6 mg/kg (startdos)	Dag 1
(Trastuzumab emtansine)	<input type="checkbox"/> 3,0 mg/kg (första dos reducering)	
	<input type="checkbox"/> 2.4 mg/kg (andra dosreducering)	
	Max två dosreduktioner tillåtna.	

Inför varje kur: Blodstatus, Neutrofila, Elstatus, Leverstatus.

OBS! Ge inf 1 på 90 min (\pm 10 min). Övervakning i minst 90 min efter avslutad infusion.

Om det går bra, ge påföljande infusioner på 30 min (\pm 10 min). Övervakning i minst 30 min efter avslutad infusion.

Cykelintervall: 21 dagar.

LVEF mätning med hjärtscint eller U-ljud var tredje månad.

OBS! Om LVEF < 50% eller en markant försämring jämfört med föregående, kontakta läkare.

Efter kur: Antiemetikaschema nr 1.

DAG 1 beställs till kl _____ avvakta ja nej **Ssk.sign Läk.sign**

BT _____ **P** _____ **kl** _____

PVC fritt filter och aggregat till Kadcyla

Inf Kadcyla (Trastuzumab emtansine) _____ mg iv i 250 ml NaCl. Inf.tid 90/30 min _____

kl: _____ Start _____

kl: _____ Stopp _____

BT _____ **P** _____ **kl** _____

Godkänt av: _____ Läkarens underskrift: _____