

Caelyx

Caelyx	40-50 mg/m ²	iv inf 1 tim	Dag 1
--------	-------------------------	--------------	-------

40 mg/m² ges till patienter som tidigare fått mycket behandling och äldre.

50 mg/m² ges till patienter som är relativt obehandlade och yngre.

Inför varje kur: Blodstatus, Neutr, Bilirubin.

OBS! Lever och hjärtfunktion.

Premedicinering enligt cytostatikaschema.

Cykelintervall 28 dagar.

Utvärderingsintervall: Datortomografi efter 3 cykler.

Efter kur: Antiemetikaschema nr 1.

För att minska risken för akuta infusionsreaktioner skall kur 1 med Caelyx ges enligt följande:

Starta infusionen med hastigheten 50 ml/timme under de första 15 minuterna. Om ingen reaktion uppträder ökas infusionshastigheten sedan under påföljande 15 min till den dubbla. Om ingen reaktion uppträtt under de första 30 minuterna ges resterande mängd infusion med ordinarie hastighet.

Behandling vid en allergisk reaktion orsakat av Caelyx – se lokala instruktioner!

Dosreduktion:

Gräns Neutrofila 1,0 TPK 75. Kontakta läkare om lägre innan kurstart.

Den dominerade dosbegränsande biverkan är palmoplantar erytodysestesi (PPE)

Om PPE grad 1 vecka 4 ges Caelyx 100%

Om PPE grad 2 vecka 4 så avvakta med dos till PPE 0-1 och då ges Caelyx 75% dos

Om PPE grad 3 vecka 4 så avvakta med dos till PPE 0-1 och ge Caelyx 75% dos. Om kvarstående PPE grad 2-3 vecka 6, utsätt behandlingen.

Patienter med nedsatt leverfunktion: Vid bilirubin 26-50 µmol/L ge 75% av dos cykel 1, vid bilirubin > 50 µmol/L ge 50% av dos cykel 1.

Var observant på hjärtfunktionen om patienten tidigare fått antracykliner, eller om kumulativa dosen överskrider motsvarande 550 mg/m² doxorubicin.