

Paklitaxel Veckovis (Palliativt) (bröstca)

Paklitaxel	80 mg/m ²	iv inf 1 tim	Dag 1, 8, 15
-------------------	----------------------	--------------	--------------

Om kur 1 A-C gått bra utan reaktioner kan efter följande kurer ges enligt schema **2 A-C**.

Se till att patienten får med sig T. Loratadin och schema, om schema 2 A-C ska ges nästa gång.

OBS! Om överkänslighetsreaktion uppträder, byt tillbaka till schema 1 A-C.

Inför varje kur: Blodstatus, Neutrofila, ASAT, ALAT.

Premedicinering enligt cytostatikaschema.

Kur 1: Pat övervakas avseende överkänslighetsreaktioner med upprepade kontroller av blodtryck, puls och AT. Läkare ska närvara de första 10 min av infusionstiden.

För att minska risken för akuta infusionsreaktioner skall Kur 1 (Dag 1, 8 och 15) med Paklitaxel ges enligt följande: Starta infusionen med hastigheten 50 ml/timme under de första 15 minuterna. Om ingen reaktion uppträder ökas infusionshastigheten sedan under påföljande 15 min till den dubbla. Om ingen reaktion uppträtt under de första 30 minuterna ges resterande mängd infusion med ordinarie hastighet.

PVC fritt filter och aggregat till Paklitaxel.

Cykelintervall 28 dagar.

Utvärderingsintervall var sjätte till nionde vecka.

Efter kur: Antiemetikaschema nr 1.

Dosreduktion: LPK <2.5 eller Neutrofila <1.0, skjut upp kuren till dessa värden uppnåtts.