

## **Paklitaxel Veckovis/Karboplatin** (Adjuvant bröstcancer, trippelnegativ)

<b>Paklitaxel</b>	80 mg/m <sup>2</sup>	iv inf 1 tim	Dag 1, 8, 15
<b>Karboplatin</b>	AUC 5	iv inf 30 min	Dag 1

CALVERTS formel: Totaldos Karboplatin i mg = (GFR+25) x AUC (area under the curve)  
För uträkning; se övr. dokument

Inför kur 1: Blodstatus, Neutr, Krea och P Cystatin C.  
Inför varje kur: Blodstatus, Neutr, Krea, ASAT, ALAT.  
Premedicinering enligt cytostatikaschema.

**Kur 1:** Pat övervakas avseende överkänslighetsreaktioner med upprepade kontroller av blodtryck, puls och AT. Läkare ska närvara de första 10 min av infusionstiden.

**För att minska risken för akuta infusionsreaktioner skall Kur 1 (Dag 1, 8 och 15) med Paklitaxel ges enligt följande:** Starta infusionen med hastigheten 50 ml/timme under de första 15 minuterna. Om ingen reaktion uppträder ökas infusionshastigheten sedan under påföljande 15 min till den dubbla. Om ingen reaktion uppträtt under de första 30 minuterna ges resterande mängd infusion med ordinarie hastighet.

PVC fritt filter och aggregat till Paklitaxel.

Cykelintervall 21 dagar.  
Utvärderingsintervall var sjätte till nionde vecka.

Efter kur: Dag 1 Antiemetikaschema nr 4.  
Dag 8 och 15: Antiemetikaschema nr 1.

**Dosreduktion:** LPK < 2.5 eller TPK < 100, skjut upp kuren tills dessa värden uppnåtts.