

Capecitabin singel

Capecitabin (Xeloda)	1000 mg/m ² x 2 per dag (Obs schema)	tabletter	Dag 1-14 (första dosen kvällen dag 1)
----------------------	--	-----------	---------------------------------------

Inför varje kur: Blodstatus, Neutr.
Premedicinering enligt cytostatikaschema.

Cykelintervall: 21 dagar.

Kur 1-2: Pat skall kontaktas varje vecka för kontroll av Capecitabin biverkningar.
From kur 3 enl. individuell bedömning.

Efter kur: Antiemetikaschema nr 1.

Patientinformation: T. Capecitabin (Xeloda) Tas tillsammans med vatten senast 30 min efter måltid.

Capecitabin reduceras enligt ROCHE's separata doseringsanvisning.

Hand-fotsyndrom eller Diarre (gäller Capecitabin) :

Toxicitet Grad	Dosjusteringar inom en behandlingscykel	Dosjustering till nästa cykel/dos, % av startdosen.
• Grad 1	Bibehåll dosnivån	Bibehåll dosnivån
• Grad 2		
-Vid första episoden	Avbryt behandlingen tills biverkningarna avtar till grad 0-1	100%
-Vid andra episoden		75%
-Vid tredje episoden		50%
-Vid fjärde episoden	Avsluta behandlingen permanent	Inte tillämbart
• Grad 3		
- Vid första episoden	Avbryt behandlingen tills biverkningarna avtar till grad 0-1	75%
- Vid andra episoden		50%
- Vid tredje episoden	Avsluta behandlingen permanent	Inte tillämbart
• Grad 4		
- Vid första episoden	Avsluta behandlingen permanent ELLER om läkaren bedömer fortsättning vara det bästa för patienten, avbryt behandlingen tills biverkningarna avtar till grad 0-1	50%
- Vid andra episoden	Avsluta behandlingen permanent	Inte tillämbart