

Trastuzumab iv/Docetaxel (Bröstca)

Trastuzumab (Herceptin) laddningsdos	8 mg/kg	iv inf 90 min	Dag 1
Trastuzumab (Herceptin) underhållsdos	6 mg/kg	iv inf 30 min	Dag 1
Docetaxel *	75- 100 mg/m ²	iv inf 1 tim	Dag 1
G-CSF**	300 µg/30 ME till patienter < 70 kg 480 µg/48 ME till patienter > 70 kg	sc inj	Dag 4 -11

**Vid lågdos Docetaxel, G-CSF ges vid efterföljande kurer om problem med neutropeni /neutropen feber.

Endast inför kur 1: ASAT, ALAT, Bilirubin.

Inför varje kur: Blodstatus, Neutr.

Mellanprov: Ta blodstatus dag 9 (nadir).

Före kur: Kortisonschema vid behandling med lågdos/högdos Docetaxel.

OBS! Trastuzumab

Vid laddningsdos. Kontinuerlig övervakning de första 15 minuterna under kur 1, sedan puls och BT kontroller var 15:e minut.

Vid underhållsdos: BT och P före infusion och 15 min efter start av infusion.

Docetaxel

Kur 1-2: Pat övervakas avseende överkänslighetsreaktioner med upprepade kontroller av blodtryck, puls och AT. Läkare ska finnas tillgänglig de första 10 min av infusionstiden.

Cykelintervall 21 dagar.

Utvärderingsintervall var sjätte till nionde vecka.

LVEF mätning med hjärtscint eller U-ljud var tredje månad.

OBS! Leverfunktion!

Trastuzumab: Vid uppehåll > 3 veckor ges ny laddningsdos endera före eller efter uppehållet.

Infusionstiden blir då längre än 30 min, läkare får då ordinera infusionstid!

*Om över 185 mg Docetaxel så skall det blandas i 500 ml NaCl istället för 250 ml.

Dosreduktion:

B-LPK (x10⁹/L)	B-Neutrofiler (x10⁹/L)	Docetaxel
< 2,5	< 1,0	Beh. Skjutes upp tills dessa värden uppnåtts

Om kuren skjuts upp 2 veckor eller mer - reducera docetaxeldosen till 75%.