

Datum: _____

Patientdata

Kur: _____

Yta: _____

Carboplatin/ Bevacizumab

(Bröstca.)

Inf Bevacizumab (Avastin)	5 mg/kg	cykelintervall 14 dagar	<input type="checkbox"/>	Dag 1
ALT ; Inf Bevacizumab	7,5 mg/kg	cykelintervall 21 dagar	<input type="checkbox"/>	Dag 1
Inf Carboplatin	AUC 7			Dag 1

Inför varje kur: Blodstatus, Neutr, Krea.

Ta urinsticka dagen före eller samma dag som kur, om proteinuri (>+1) avvakta med inf Bevacizumab och kontakta läkare! Vg se under fliken kontrollschema vid proteinuri vid Bevacizumab behandling.

Om blodtrycket > 150/90 avvakta med inf Bevacizumab och kontakta läkare!

Ge inf Bevacizumab nr 1 på 90 min, om det går bra; ge inf nr 2 på 60 min, om det går bra; ge fortsatta infusioner på 30 min.

Ge första infusionen Bevacizumab före cytostatika, resterande infusioner kan ges före eller efter.

OBS! Risk för gastrointestinal perforation, sämre sårhelingsprocess.

Cykelintervall: 14 dagar för Bevacizumab om Carboplatin ges var 4:e vecka annars används 21 dagar till båda drogerna.

Efter kur: Antiemetikaschema nr 4.

DAG 1 beställs till kl _____ avvakta ja nej **Ssk.sign Läk.sign**

Inj Ondansetron 8 mg iv _____

Inj Betapred 8 mg iv _____

BT _____ P _____ U-protein _____

Inf Bevacizumab _____ mg iv i 100 ml NaCl Inf.tid 90/60/30 min _____

Start _____

Stopp _____

Inf Carboplatin _____ mg iv i 500 ml Glucos 50 mg/ml inf.tid 30 min _____

Start _____

Stopp _____

Peroral profylax

Ssk.sign Läk.sign

Antiemetikaschema nr 4. _____

Godkänt av: _____ Läkarens underskrift: _____