

Carboplatin/Bevacizumab (bröstca)

Bevacizumab (Avastin)	5 mg/kg cykelintervall 14 dagar <input type="checkbox"/>	iv inf 90/60/30 min	Dag 1
ALT. Bevacizumab	7,5 mg/kg cykelintervall 21 dagar <input type="checkbox"/>	iv inf 90/60/30 min	Dag 1
Carboplatin	Standarddos AUC 7	iv inf 30 min	Dag 1

CALVERTS formel: Totaldos Carboplatin i mg = (GFR+25) x AUC (area under the curve)

För uträkning; se övr. dokument.

Cykelintervall: 14 dagar för Bevacizumab om Carboplatin ges var 4:e vecka annars används 21 dagar till båda drogerna.

Inför varje kur: Blodstatus, Neutr, Krea.
Premedicinering enligt cytostatikaschema.

Ta urinsticka dagen före eller samma dag som kur, om proteinuri (>+1) avvakta med inf Bevacizumab och kontakta läkare! Vg se under fliken kontrollschema vid proteinuri vid Bevacizumab behandling.

Om blodtrycket > 150/90 avvakta med inf Bevacizumab och kontakta läkare!

Ge inf nr 1 på 90 min, om det går bra; ge inf nr 2 på 60 min, om det går bra; ge fortsatta infusioner på 30 min.

Ge första infusionen Bevacizumab före cytostatika, resterande infusioner kan ges före eller efter.

OBS! Risk för gastrointestinal perforation, sämre sårhelingsprocess.

Vid recidivbehandling: Ge Inj.Tavegil 2 mg för att undvika överkänslighetsreaktioner.

Efter kur: Antiemetikaschema nr 4.

Dosreduktion:

B-Neutrofiler (x10⁹/L)	B-TPK (x10⁹/L)	Carboplatin	Bevacizumab
>1,0	>100	100%	100%
1,0-0,5	99-75	75%	75%
<0,5	<50	Beh. uppskjutes en vecka	