

FinXX-regim CEX (kur 4-6)

Epirubicin	75 mg/m ²	iv inf 1 tim	Dag 1
Cyklofosamid	600mg/m ²	iv inf 15 min	Dag 1
Capecitabin (Xeloda)	900 mg/m ² x 2 /dag	tabletter	Dag 1-14 (första dosen kvällen dag 1)

Inför varje kur: Blodstatus, Neutr.

Mellanprov: Blodstatus tas dag 11 el 12 (nadir).

Premedicinering enligt cytostatikaschema.

OBS! Lever och hjärtfunktion.

Cykelintervall: 21 dagar.

Utvärderingsintervall var sjätte till nionde vecka.

Efter kur 1 och 2: Patienten skall kontaktas dag 8 för kontroll av Capecitabin biverkningar. From kur 3 enl. Individuell bedömning.

Efter kur: Antiemetikaschema nr 6.

Dosreduktion:

Neutrofila 1.0, trombocyter 120, max uppskjuten kur 1 v.

Om då neutrofila ≤ 1.5 eller trombocyter < 120 (eller uppskjuten kur för andra gången) görs 20% dosreduktion.

Vid neutropen feber eller neutrofila < 0.5 i > 1 vecka görs 20% reduktion.

Capecitabin reduceras enligt ROCHE´s separata doseringsanvisning.

Hand-fotsyndrom eller Diarre (gäller Capecitabin) :

Toxicitet Grad	Dosjusteringar inom en behandlingscykel	Dosjustering till nästa cykel/dos, % av startdosen.
• Grad 1	Bibehåll dosnivån	Bibehåll dosnivån
• Grad 2		
-Vid första episoden	Avbryt behandlingen tills biverkningarna avtar till grad 0-1	100%
-Vid andra episoden		75%
-Vid tredje episoden		50%
-Vid fjärde episoden	Avsluta behandlingen permanent	Inte tillämbart
• Grad 3		
- Vid första episoden	Avbryt behandlingen tills biverkningarna avtar till grad 0-1	75%
- Vid andra episoden		50%
- Vid tredje episoden	Avsluta behandlingen permanent	Inte tillämbart
• Grad 4		
- Vid första episoden	Avsluta behandlingen permanent ELLER om läkaren bedömer fortsättning vara det bästa för patienten, avbryt behandlingen tills biverkningarna avtar till grad 0-1	50%
- Vid andra episoden	Avsluta behandlingen permanent	Inte tillämbart