

Docetaxel (Taxotere) Högdos (Bröst, adjuvant till högriskpatienter)

Docetaxel	100 mg/m ²	iv inf 1 tim	Dag 1
G-CSF	300 µg/30 ME till patienter < 70 kg 480 µg/48 ME till patienter > 70 kg	sc inj	Dag 4 -11

Före kur: Kortisonschema för högdos Docetaxel.

Endast inför kur 1: ASAT, ALAT, Bilirubin.

Inför varje kur: Blodstatus, Neutr.

Mellanprov: Ta blodstatus dag 9 (nadir).

Premedicinering enligt cytostatikaschema.

Kur 1-2: Pat övervakas avseende överkänslighetsreaktioner med upprepade kontroller av blodtryck, puls och AT.

Cykelintervall 21 dagar.

Utvärderingsintervall var sjätte till nionde vecka.

*Om över 185 mg Docetaxel så skall det blandas i 500 ml NaCl istället för 250 ml.

OBS! Leverfunktion!

Docetaxel/EC kurer kan ges sekventiellt.

Dosreduktion:

B-LPK (x10⁹/L)	B-Neutrofiler (x10⁹/L)	Docetaxel
< 2,5	< 1,0	Beh. Skjutes upp tills dessa värden uppnåtts

Om kuren skjuts upp 2 veckor eller mer- reducera Docetaxel till 75%.