

Vinorelbin (metastaserad bröstcancer)

Vinorelbin	*25- 30 mg/m ²	iv infusion 5-10 min	Dag 1 och 8
Kapsel Vinorelbin (Navelbin)	**60- 80 mg/m ² (finns i 20, 30 och 80 mg)	kapsel po	Dag 1 och 8

Peroral behandling som **alternativ** till iv inf. Kan skötas i hemmet.

*25 mg/m² ges till patienter som tidigare fått mycket behandling och äldre.

*30 mg/m² ges till patienter som är relativt obehandlade och yngre.

**60 mg/m² startdos. Doseskalera till 80 mg/m² om toxicitet tillåter.

Inför kur: Blodstatus, Neutr.

Premedicinering enligt cytostatikaschema.

Cykelintervall 21 dagar.

Utvärderingsintervall: Var sjätte till nionde vecka.

Efter kur: Antiemetikaschema nr 1.

Patientinformation: Kapslarna ska sväljas hela med ett glas vatten, gärna kallt.

Tas med fördel på kvällen efter måltid.

Dosreduktion: LPK < 2.5 eller Neutrofila < 1.0, skjut upp kuren tills dessa värden uppnåts. Om kuren skjuts upp 2 veckor eller mer – reducera doserna till 75%.