

Datum: \_\_\_\_\_

Patientdata

Kur: \_\_\_\_\_

Yta: \_\_\_\_\_

## Vinorelbin

(Bröstca.)

Inf. Vinorelbin	*25- 30 mg/m <sup>2</sup>	Dag 1 och 8
Kapsel Vinorelbin (Navelbin)	**60- 80 mg/m <sup>2</sup> (finns i 20, 30 och 80 mg)	Ges istället för inf. Dag 1 och 8

\*25 mg/m<sup>2</sup> ges till patienter som tidigare fått mycket behandling och äldre.

\*30 mg/m<sup>2</sup> ges till patienter som är relativt obehandlade och yngre.

\*\*60 mg/m<sup>2</sup> startdos. Doseskalera till 80 mg/m<sup>2</sup> om toxicitet tillåter.

**Inför varje kur:** Blodstatus, Neutr.

**Cykelintervall:** 21 dagar.

**Efter kur:** Antiemetikaschema nr 1.

**Inför dag 8 om po beh:** Kontrollera blodprover och kontakta patienten för information om tabletter ska tas eller ej.

**DAG 1** \_\_\_\_\_ beställs till kl \_\_\_\_\_ avvakta ja nej **Ssk.sign Läk.sign**

**Po. tas 1 tim före behandling**

**T/Inj Betapred** 4 mg po/iv \_\_\_\_\_

**Inf Vinorelbin** \_\_\_\_\_ mg iv i 100 ml Nacl Inf.tid 5-10 min \_\_\_\_\_

**DAG 8** \_\_\_\_\_ beställs till kl \_\_\_\_\_ avvakta ja nej **Ssk.sign Läk.sign**

**Po. tas 1 tim före behandling**

**T/Inj Betapred** 4 mg po/iv \_\_\_\_\_

**Inf Vinorelbin** \_\_\_\_\_ mg iv i 100 ml Nacl Inf.tid 5-10 min \_\_\_\_\_

### Alternativt:

Patientinformation: Kapslarna ska sväljas hela med ett glas vatten, gärna kallt.

Tas med fördel på kvällen efter måltid.

**DAG 1** \_\_\_\_\_ **Ssk.sign Läk.sign**

Behandlingen dag 1 kan ges i hemmet i form av kapslar Navelbin

Ordinera premed ca 1 tim före intag av kapslarna

**T Ondansetron** 8 mg po \_\_\_\_\_

**Kapsel Navelbin** \_\_\_\_\_ mg po (förslagsvis ca kl 20) \_\_\_\_\_

**DAG 8** \_\_\_\_\_ **Ssk.sign Läk.sign**

Behandlingen dag 8 kan ges i hemmet i form av kapslar Navelbin

Ordinera premed ca 1 tim före intag av kapslarna

**T Ondansetron** 8 mg po \_\_\_\_\_

**Kapsel Navelbin** \_\_\_\_\_ mg po (förslagsvis ca kl 20) \_\_\_\_\_

Godkänt av: \_\_\_\_\_ Läkarens underskrift: \_\_\_\_\_

HL/MAE 151125