

## Docetaxel/DeGramont

<b>Docetaxel</b>	45 mg/m <sup>2</sup>	iv inf 30 min	Dag 1
<b>Calciumfolinat</b>	200 mg/m <sup>2</sup> (jämna 50-tal)	iv inf 1 tim	Dag 1
<b>5-Fluorouracil</b>	400 mg/m <sup>2</sup> (jämna 50-tal)	iv bolus 2-3 min	Dag 1
<b>5-Fluorouracil</b>	2800 mg/m <sup>2</sup> /46 h (jämna 100-tal)	iv inf kontinuerligt 46 tim	Dag 1 till 3

Inför varje kur: Blodstatus, Neutr.  
Premedicinering enligt cytostatikaschema.

Kur 1-2: Pat övervakas avseende överkänslighetsreaktioner med upprepade kontroller av blodtryck, puls och AT.

Cykelintervall 14 dagar.  
Utvärderingsintervall efter 4 kurer.  
Efter kur: Antiemetikaschema nr 3.

### Dosreduktion:

<b>B-LPK (x10<sup>9</sup>/L)</b>	<b>B-TPK (x10<sup>9</sup>/L)</b>	<b>Docetaxel</b>	<b>5-FU</b>	<b>Calciumfolinat</b>
>3,0	>100	100%	100%	100%
2,9-2,5	99-75	75%	75%	100%
2,4-2,0	74-50	50%	50%	100%
<2,0	<50	Beh uppskjutes en vecka		