

Inklusionskriterier – diagnossektioner

Kvalitetsregistret för CERVIX/VAGINALCANCER. Version 1.1, gäller från 2013-04-22

Lägeskoder	<p>ICD-10 (WHO-klassifikation som används kliniskt)</p> <p>C52 Malign tumör i vagina C53.0 Malign tumör i endocervix C53.1 Malign tumör i exocervix C53.8 Malign tumör i cervix med övergripande växt C53.9 Icke specificerad lokalisering av malign tumör i cervix uteri</p> <p>ICD-O/3 (WHO-klassifikation som används av tumörregistret)</p> <p>C52.9 Malign tumör i vagina UNS C53.0 Endocervix C53.1 Exocervix/portio C53.8 Överväxt till/från angränsande sublokal inom livmoderhalsen (C53) med okänt ursprung C53.9 Livmoderhals UNS</p> <p>Endast maligna tumörer inkluderas, cancer in situ eller osäkert maligna eller benigna tumörer inkluderas inte.</p>
ICD-O/2* morfologikod	Slutsiffran i morfologi-koden enligt ICD-O/2 skall vara 3. ICD-O/2 koder inom intervallet ≥80003 och <95900.
Diagnosgrund	<p>Alla tumörer diagnostiserade med provexcision eller operation med histopatologisk undersökning (diagnosgrund 3) skall registreras.</p> <p>Exklusion: Patienter som diagnostiserats enbart med klinisk undersökning (diagnosgrund 1); röntgen, scintigrafi, ultraljud, MR, CT (eller motsvarande undersökning) (diagnosgrund 2); obduktion med eller utan histopatologisk undersökning (diagnosgrund 4,7); cytologisk undersökning (diagnosgrund 5); operation utan histopatologisk undersökning (diagnosgrund 6); eller annan laboratorieundersökning (diagnosgrund 8) ingår inte.</p>
Ålder	≥18 år.
Beräkning av täckningsgrad i INCA för RCC:	<p>1. Maligna tumörer i vagina; ICD-O/3 lägeskod C52.9, morfologikod enligt ICD-O/2 slutar med 3. ICD-O/2 koder inom intervallet ≥80003 och <95900. Diagnosgrund 3. Ålder ≥18 år.</p> <p>2. Maligna tumörer i cervix; ICD-O/3 lägeskod C53.0 eller C53.1 eller C53.8 eller C53.9, morfologikod enligt ICD-O/2 slutar med 3. ICD-O/2 koder inom intervallet ≥80003 och <95900. Diagnosgrund 3. Ålder ≥18 år.</p>

* Cancerregistret använder nu ICD-O/3 som översätts till ICD-O/2. Av tekniska skäl har vi valt att använda ICD-O/2 morfologikod som urvalskriterium.