

## Gemcitabin/Cisplatin

(ovarialcancer)

<b>Gemcitabin</b>	750 mg/m <sup>2</sup>	iv inf 30 min	Dag 1 och 8
<b>Cisplatin</b>	30 mg/m <sup>2</sup>	iv inf 2 tim	Dag 1 och 8

Premedicinering enligt cytostatikaschema

Före behandlingsstart: Njurfunktionskontroll (P Cystatin C eller kreatininclearance eller Iohexolclearance) och Krea före behandlingsstart. Därefter Krea före varje behandling.

Aminoglycosid skall ej ges under eller inom en månad efter Cisplatinbehandling. Om njurfunktionen är normal kan det sedan användas vid behov

Efter kur: Antiemetikaschema nr 4

Cykelintervall 21 dagar

Utvärderingsintervall efter 3 cykler

Dosreduktion:

<b>GFR ml/min</b>	<b>Gemcitabin</b>	<b>Cisplatin</b>
<60	100%	Cisplatin ersätts med Carboplatin doserat enligt Calverts formel

**OBS!** om den nedsatta njurfunktionen beror på tumörobstruktion gives fulldos cisplatin

Dosreduktion:

<b>B-Neutrofiler (x10<sup>9</sup>/L)</b>	<b>B-TPK (x10<sup>9</sup>/L)</b>	<b>Cisplatin</b>	<b>Gemcitabin</b>
>1,0	>100	100%	100%
1,0-0,5	99-75	75%	75%
<0,5	<50	Beh. uppskjutes en vecka	