

Veckovis Cisplatin under pågående strålbehandling

(avancerad cervixcancer)

Cisplatin	40 mg/m ²	iv inf 1 tim	1 gång/vecka under påg. SB
------------------	----------------------	--------------	----------------------------

MAXdos Cisplatin = 70 mg/ kur.

Före varje behandling: Blodstatus, Neutr, Na, K, Krea, Mg.
Premedicinering enligt cytostatikaschema.

Inför kur 1: Njurfunktionskontroll, P Cystatin C eller beräknat enl Cockroft-Gault). Vid nedsatt njurfunktion individuell dosering av Cisplatin.

Aminoglycosid skall ej ges under eller inom en månad efter Cisplatinbehandling. Om njurfunktionen är normal kan det sedan användas vid behov.

Ge Cisplatin-infusion före strålbehandling, starta tidigast 10 tim innan strålbehandling.

Vikt x 2 dag 1. Inj/T Furix 20 mg vid viktökning >1 kg.
Efter kur: Antiemetikaschema nr 3.

Cykelintervall: 1 gång/vecka under påg. SB Start v 1. Totalt 6 beh., max.

Dosreduktion:

GFR ml/min	Cisplatin
<60	Individuell dosering
<40	Cisplatin utsättes

Dosreduktion:

B-Neutrofiler (x10⁹/L)	B-TPK (x10⁹/L)	Cisplatin
>1,0	>100	100%
1,0-0,8	99-75	50%
<0,8	<50	Beh. uppskjutes en vecka