

## Cisplatin/5-FU (pump eller kontinuerligt 5-FU dropp) (cervixcancer)

<b>Cisplatin</b>	30 mg/m <sup>2</sup>	iv inf 1 tim	Dag 1
<b>5-FU</b>	15-20 mg/kg/dygn	iv kontinuerlig inf	Dag 1-5

Premedicinering enligt cytostatikaschema.

Före behandlingsstart: Njurfunktionskontroll (P Cystatin C eller kreatininclearance eller Iohexolclearance). Om fullgod njurfunktion kan enbart kreatinin följas vid enstaka följande kurer, men om flertal kurer skall ges eller om nedsatt njurfunktion-alternativt vid signifikant kreatininstegring skall ny njurfunktionskontroll utföras. Vid nedsatt njurfunktion individuell dosering av Cisplatin. Aminoglycosid skall ej ges under eller inom en månad efter Cisplatinbehandling. Om njurfunktionen är normal kan det sedan användas vid behov

Efter kur: kontinuerligt 5-FU dropp: Antiemetikaschema nr 1  
pump: Antiemetikaschema nr 4

Cykelintervall 28 dagar

Utvärderingsintervall: Efter 3 cykler

Dosreduktion:

<b>GFR ml/min</b>	<b>5-FU</b>	<b>Cisplatin</b>
<60	100%	Cisplatin ersätts med Carboplatin doserat enligt Calverts formel

**OBS!** om den nedsatta njurfunktionen beror på tumörobstruktion gives fulldos cisplatin

Dosreduktion:

<b>B-Neutrofiler (x10<sup>9</sup>/L)</b>	<b>B-TPK (x10<sup>9</sup>/L)</b>	<b>Cisplatin</b>	<b>5-FU</b>
>1,0	>100	100%	100%
1,0-0,5	99-75	75%	75%
<0,5	<50	Beh. uppskjutes en vecka	