

Datum: \_\_\_\_\_  
Kur: \_\_\_\_\_  
Yta: \_\_\_\_\_

Patientdata

## **Cisplatin/Topotekan**

(Cervixcancer recidiv)

Cisplatin	50 mg/m <sup>2</sup> /dag	Dag 1
Topotekan (Hycamtin)	0,75 mg/m <sup>2</sup> /dag	Dag 1-3

### **MAX Kroppsyta 2,0**

Prover inför behandling: Blodstatus, Neutr, Na, K, Krea, Mg, Leverstaus.

Vikt x 2 dag 1. Inj/T Furix 20 mg vid viktökning >1 kg.

Cykelintervall 21 dagar.

Efter kur: Antiemetikaschema nr 4.

Mellandags prover Dag 8, 15.

Patienten ska dricka rikligt med vätska första behandlings dygnet, minst 1L efter behandlingen.

**DAG 1** beställs till kl \_\_\_\_\_ avvakta ja nej **Ssk.sign Läk.sign**

kl \_\_\_\_\_ vikt \_\_\_\_\_

**K Emend** 125 mg

**Inj Ondansetron** 8 mg iv

**Inj Betapred** 16 mg iv

**Inf Topotekan** \_\_\_\_\_ mg iv i 100 ml NaCl. Inf.tid 30 min.

Start \_\_\_\_\_

Stopp \_\_\_\_\_

**Inf NaCl** 1000 ml Inf tid 1 tim

Start \_\_\_\_\_

**Inj Furix** 20 mg iv före Cisplatin

**Inf Cisplatin** \_\_\_\_\_ mg iv i 1000 ml NaCl. Inf.tid 1 tim

Start \_\_\_\_\_

Stopp \_\_\_\_\_

**Inf NaCl** 1000 ml Inf.tid 1 tim

Start \_\_\_\_\_

kl \_\_\_\_\_ vikt \_\_\_\_\_

Inj/T Furix 20 mg vid viktökning >1 kg

**DAG 2** beställs till kl \_\_\_\_\_ **Ssk.sign Läk.sign**

**K Emend** 80 mg

**Inj Ondansetron** 8 mg iv

**Inj Betapred** 8 mg iv

**Inf Topotekan** \_\_\_\_\_ mg iv i 100 ml NaCl. Inf.tid 30 min

Start \_\_\_\_\_

Stopp \_\_\_\_\_

**DAG 3** beställs till kl \_\_\_\_\_ **Ssk.sign Läk.sign**

**K Emend** 80 mg

**Inj Ondansetron** 8 mg iv

**Inj Betapred** 8 mg iv

**Inf Topotekan** \_\_\_\_\_ mg iv i 100 ml NaCl. Inf.tid 30 min

Start \_\_\_\_\_

Stopp \_\_\_\_\_

Godkänd av: \_\_\_\_\_ Läkarens underskrift: \_\_\_\_\_