

Doxorubicin/Cisplatin (corpuscancer)

Doxorubicin	50 mg/m ²	iv inf 1 tim	Dag 1
Cisplatin	50 mg/m ²	iv inf 1 tim	Dag 1

Premedicinering enligt cytostatikaschema

Före behandlingsstart: Njurfunktionskontroll (P Cystatin C eller kreatininclearance eller Iohexolclearance). Om fullgod njurfunktion kan enbart kreatinin följas vid enstaka följande kurer, men om flertal kurer skall ges eller om nedsatt njurfunktion-alternativt vid signifikant kreatininstegring skall ny njurfunktionskontroll utföras. Vid nedsatt njurfunktion individuell dosering av Cisplatin.

Kontroll av audiogram innan Cisplatinbehandling.

Aminoglycosid skall ej ges under eller inom en månad efter Cisplatinbehandling. Om njurfunktionen är normal kan det sedan användas vid behov

Max ackumulerad dos av Doxorubicin 550 mg/m²

Efter kur: Antiemetikaschema nr 5

Cykelintervall 21 dagar

Utvärderingsintervall: efter 3 cykler

Dosreduktion:

GFR ml/min	Doxorubicin	Cisplatin
<60	50%	Cisplatin ersätts med Carboplatin doserat enligt Calverts formel

OBS! om den nedsatta njurfunktionen beror på tumörobstruktion gives fulldos cisplatin

Dosreduktion:

B-Neutrofiler (x10⁹/L)	B-TPK (x10⁹/L)	Doxorubicin	Cisplatin
>1,0	>100	100%	100%
1,0-0,5	99-75	75%	75%
<0,5	<50	Beh. uppskjutes en vecka	