

LOMUSTIN (CCNU)

Varje behandlingsperiod består av 42 dagar (1 dags behandling, 41 dagar uppehåll).

Ta LOMUSTIN på fastande mage (minst 3 timme före, fasta även 1 timma efter intag av kapslarna). Kapslarna ska sväljas hela med ett glas vatten. De får **inte öppnas eller tuggas**.

Om Du kräks efter att Du tagit LOMUSTIN -dosen ska Du inte ta en andra dos den dagen.

Mot illamående:

Stolpiller Primperan 20 mg vid behov eller tabl Primperan 10 mg vid behov.

Inför start av kur ska Dina blodvärden vara tillräckligt bra för att vi ska kunna ge Dig en ny behandling. Om detta ej är uppfyllt kontrolleras värdena på nytt. När värdena tillåter behandling ges LOMUSTIN och då eventuellt med en dosjustering enligt ett speciellt schema.

DAG 1	Datum _____	Läk sign
T Ondansetron 8 mg , 1 tablett 1 1/2 timme före Lomustin		
Din totala dos Lomustin: _____ mg		_____
Detta innebär att Du tar följande antal kapslar:		
K Lomustin 40 mg _____ kapslar		

Om du har problem eller funderar över något så kontakta enl. nedan.

För dig som får behandling i Uppsala gäller:
 Onkologens dagvårdsavdelning
 Tel 018 – 611 55 15 kl 8-11.30 vardagar.

Övriga tider ring:
 78 B 018-6115475 alt.
 78 C 018-6115511

För dig som får behandling i _____
 gäller telefonnummer _____