

JOURNALHANDLING

Datum: _____
 Kur: _____
 Vikt: _____
 Längd: _____
 Yta: _____

Patientdata

TEMOZOLOMID (TEMODAL)
 (Maligna gliom)

K Temodal	150-200 mg/m ² *	Dag 1-5
-----------	-----------------------------	---------

*För patient som tidigare erhållit kemoterapi är startdosen 150 mg/m².
 Om denna dos tolereras väl, öka till 200 mg/m² vid kur 2.

Inför kur 1: Blodstatus, Neutro.
Under behandlingen: Blodstatus, Neutro och B-celler klassificering tas dag 22.
Cykelintervall: 28 dagar.
OBS! Överväg profylax med Eusaprim Forte 1x1, må-ons-fre, framförallt vid högdos kortison under längre tid eller LPK (lymfocyter) <0,5.
K Temodal sväljs hela tillsammans med lite vatten. Kapslar får ej öppnas eller tuggas.
OBS! Om kräkning uppträder efter att dosen K.Temodal givits skall **inte** en andra dos ges den dagen.
Efter kur: Antiemetikaschema nr 1.
Ge blad 2 till patienten.

Ordination dag 1-5

Ssk sign Läk sign

T Betapred 0,5 mg , 8 tabl morgon	_____	_____
T Ondansetron 8 mg po 1 tablett 1½ timme före K Temodal	_____	_____
K Temodal _____ mg po, motsvarar _____ st kaps á 20 mg		_____
	_____ st kaps á 100 mg	
	_____ st kaps á 140 mg	
	_____ st kaps á 180 mg	
	_____ st kaps á 250 mg	
Delat i dosett för 5 dagar.	_____	

Godkänt av: _____ Läkarens underskrift _____