

Carboplatin/Doxorubicin (melanom)

Carboplatin	AUC 5	iv inf 1 tim	Dag 1
Doxorubicin	50 mg/m ²	iv inf 1 tim	Dag 1

CALVERTS formel: Totaldos Carboplatin i mg = (GFR+25) x AUC (area under the curve)

För uträkning; se övr. dokument.

Inför kur 1: Blodstatus, inkl Neutr, P Cystatin C, Krea.

Inför varje kur: Blodstatus, inkl Neutr, Krea.

Premedicinering enligt cytostatikaschema.

Max ackumulerad dos av Doxorubicin 550 mg/m². Om strålbeh. mot hjärtat givits/planerats max dos 400 mg/m². För patienter som inte är tidigare helt hjärtfriska rekommenderas EKG. Om hjärtsymptom bör LVEF undersökas innan behandling.

Efter kur: Antiemetikaschema nr 5.

Cykelintervall 21 dagar.

Utvärderingsintervall efter 3 cykler.

Dosreduktion:

B-LPK (x10⁹/L)	B-TPK (x10⁹/L)	Carboplatin	Doxorubicin
>3,0	>100	100%	100%
2,9-2,5	99-75	75%	75%
≤2,4	74-50	Beh uppskjutes 3-7 dagar	