

Datum: \_\_\_\_\_

Patientdata

Kur: \_\_\_\_\_

Yta: \_\_\_\_\_

## Cisplatin/Doxorubicin

(malignt melanom)

Inf Cisplatin	75 mg/m <sup>2</sup>	Dag 1
Inf Doxorubicin	60 mg/m <sup>2</sup>	Dag 1

Inför varje kur: Blodstatus, inkl Neutr, Krea.

Inför kur 1: Audiometri. P Cystatin C, Blodstatus, inkl Neutr.

Cykelintervall 21 dagar.

Akkumulerad dos Doxorubicin bör ej överstiga 550 mg/m<sup>2</sup> kroppsytta.

Efter kur: Antiemetikaschema nr 5.

Vätskelista och urinmätning.

Vikt x 3/dag. Inj Furix 40 mg iv vid viktökning >2 kg.

### DAG 1

beställs till kl \_\_\_\_\_ avvakta ja nej

Ssk.sign Läk.sign

Vikt \_\_\_\_\_ kl \_\_\_\_\_

Inj Ondansetron 8 mg iv

Inj Betapred 8 mg iv kl \_\_\_\_\_

Inf Doxorubicin \_\_\_\_\_ mg iv i 500 ml NaCl. Inf.tid 1 tim

Start \_\_\_\_\_

Inf NaCl 1000 ml + 20 mmol K Inf.tid 1,5 tim

Diures minst 400 ml efter 2 timmar.

Start \_\_\_\_\_

Inf NaCl 1000 ml + 20 mmol K Inf.tid 1,5 tim

Start \_\_\_\_\_

Inf Cisplatin \_\_\_\_\_ mg iv i 1000 ml NaCl. Inf.tid 1 tim

Start \_\_\_\_\_

Inf NaCl 1000 ml + 20 mmol K + 5 mmol Mg Inf.tid 1 tim

Start \_\_\_\_\_

Vikt \_\_\_\_\_ kl \_\_\_\_\_

Viktökning >2 kg ge T/Inj Furix 40 mg

### Peroral profylax

Ssk.sign Läk.sign

Antiemetikaschema nr 5.

Godkänt av: \_\_\_\_\_ Läkarens underskrift: \_\_\_\_\_