

Cisplatin/Doxorubicin (melanom)

Doxorubicin	60 mg/m ²	iv inf 1 tim	Dag 1
Cisplatin	75 mg/m ²	iv inf 1 tim	Dag 1

Inför varje kur: Blodstatus, inkl Neutr, Krea.

Inför kur 1: Audiometri, Blodstatus, Neutr, P Cystatin C.

Premedicinering enligt cytostatikaschema.

Före behandlingsstart: Njurfunktionskontroll (P Cystatin C eller kreatininclearance eller Iohexolclearance). Om fullgod njurfunktion kan enbart kreatinin följas vid enstaka följande kurer, men om flertal kurer skall ges eller om nedsatt njurfunktion-alternativt vid signifikant kreatininstegring skall ny njurfunktionskontroll utföras. Vid nedsatt njurfunktion individuell dosering av Cisplatin. Kontroll av audiogram innan Cisplatinbeh. Cisplatin ges med forcerad diures. Aminoglykosid skall ej givas under eller inom en månad efter Cisplatin-behandling. Om njurfunktionen är normal kan det sedan användas vid behov.

Max ackumulerad dos av Doxorubicin 550 mg/m². Om strålbeh. mot hjärtat givits/planerats max dos 400 mg/m². För patienter som inte är tidigare helt hjärtfriska rekommenderas EKG. Om hjärtsymptom bör LVEF undersökas innan behandling.

Efter kur: Antiemetikaschema nr 5.

Cykelintervall 21 dagar.

Utvärderingsintervall efter 3 cykler.

Om GFR <60 byt till Carboplatin.

Dosreduktion:

B-LPK (x10⁹/L)	B-TPK (x10⁹/L)	Cisplatin	Doxorubicin
>3,0	>100	100%	100%
2,9-2,5	99-75	75%	75%
≤2,4	74-50	Beh uppskjutes 3-7 dagar	