

Datum: \_\_\_\_\_

Patientdata

Kur: \_\_\_\_\_

Yta: \_\_\_\_\_

**DCC**

(malignt melanom)

Inf Dacarbazin	800 mg/m <sup>2</sup>	Dag 1
Inf Cisplatin	100 mg/m <sup>2</sup>	Dag 2
K Lomustine (CCNU)	80 mg	Dag 3
Inj G-CSF	Standarddos	Dag 5-12

Inför kur 1: Blodstatus, inkl Neutr, P Cystatin C, Krea, Audiometri.

Inför varje kur: Blodstatus, inkl Neutr, Krea.

Cykelintervall 21 dagar.

Efter kur: Antiemetikaschema nr 4 med start dag 3 i kuren.

OBS! Olika infusionstid beroende på infart som används. Ringa in det alt. som används.

**DAG 1** beställs till kl \_\_\_\_\_ avvakta ja nej **Ssk.sign** **Läk.sign****Inj Ondansetron** 8 mg iv \_\_\_\_\_**Inj Betapred** 8 mg iv \_\_\_\_\_**Inf Dacarbazin** \_\_\_\_\_ mg iv i 500 ml NaCl. \_\_\_\_\_

Start \_\_\_\_\_

Inf.tid (central infart) 30 min eller \_\_\_\_\_

Stopp \_\_\_\_\_

Inf.tid (perifer infart) 2 tim \_\_\_\_\_

**DAG 2** beställs till kl \_\_\_\_\_ **Ssk.sign** **Läk.sign**

kl \_\_\_\_\_ vikt \_\_\_\_\_

**Inj Ondansetron** 8 mg iv \_\_\_\_\_**Inj Betapred** 8 mg iv \_\_\_\_\_**Inf NaCl** 1000 ml + 20 mmol K. Inf.tid 1.5 tim \_\_\_\_\_

Start \_\_\_\_\_

**Inf NaCl** 1000 ml + 20 mmol K. Inf.tid 1.5 tim \_\_\_\_\_

Start \_\_\_\_\_

**Inf Cisplatin** \_\_\_\_\_ mg iv i 1000 ml NaCl. Inf.tid 1 tim \_\_\_\_\_

Start \_\_\_\_\_

Stopp \_\_\_\_\_

**Inf NaCl** 1000 ml + 20 mmol K + 5 mmol Mg. Inf.tid 1 tim \_\_\_\_\_

Start \_\_\_\_\_

kl \_\_\_\_\_ vikt \_\_\_\_\_ T/Inj Furix 40 mg vid viktökning &gt;2 kg \_\_\_\_\_

**DAG 3** **Ssk.sign** **Läk.sign****K Lomustine (CCNU)** 2 st tabl. á 40 mg \_\_\_\_\_**Ssk.sign** **Läk.sign****DAG 5-12****Start av Inj G-CSF** sc som skall ges 1 gång/dag i 8 dagar (se ovan) \_\_\_\_\_**Peroral profylax****Ssk.sign** **Läk.sign****Antiemetikaschema nr 4.** \_\_\_\_\_

Godkänt av: \_\_\_\_\_ Läkarens underskrift: \_\_\_\_\_