

Nivolumab

| | | | |
|--------------------|--|---------------|-------|
| Nivolumab (Opdivo) | 3 mg/kg (avrundas nedåt till jämna 40-tal) | iv inf 60 min | Dag 1 |
|--------------------|--|---------------|-------|

Inför kur 1: HCG på **fertila** kvinnor inom 24 timmar före dos.

Inför varje kur, inom 3 dagar: Blodstatus, b-celler, Alb, bilirubin, ALAT, ASAT; ALP, Ca, Cl, Fosfat, Glucos, K, kreatinin, LD, lipas, Mg, Na, Urea.

Varannan cykel (2,4,6 osv): TSH, Fritt T3 och fritt T4.

Varannan cykel: HCG på fertila kvinnor.

Pat skall kontaktas dag 8-10 mellan behandlingarna för att kontrollera AT, använd frågeformulär för ipilimumab tv.

Övervakning kur 1: Patienten övervakas avseende överkänslighetsreaktioner med upprepade kontroller av blodtryck, puls och AT.

Ev premedicinering om reaktion vid föregående kur.

Cykelintervall: 14 dagar.

Hantering av infusionsrelaterade symtom:

- 1. Vid reaktion med flush, rodnad och/eller feber <38 = minska hastigheten med 50%** , förvärras symtomen, stäng av infusionen. Starta igen på halverad hastighet när symtomen avklingat. Halvera infusionshastigheten enl ovan nästkommande behandlingar. Se till att få ordinerat pre med.
- 2. Allergisk reaktion, urticaria, dyspné feber >38=stoppa infusionen.** Ge LM enl lokal praxis eller enligt läkarordination. Starta på nytt när symtom avklingat på halverad hastighet resten av infusionen och de nästkommande behandlingarna, glöm inte pre med.
- 3. Kraftig allergisk reaktion, anafylaxi, brochospasm, hypotension mm =stoppa infusionen.** Ge LM enl lokal praxis eller läkarordination.

Ingen dosreduktion av nivolumab.

För biverkningar se dosreduktionsblad Ipilimumab.

Snabbguide för biverkningar vid Ipilimumab (kan användas till nivolumab tv.)