

Cisplatin veckovis + strålbehandling

Cisplatin	20 mg/m ²	iv inf 1 tim	Dag 1
------------------	----------------------	--------------	-------

Inför kur 1: Blodstatus, Krea, P Cystatin C och Audiometri.

Inför varje kur: Blodstatus, Neutr. Var tredje vecka tas S-Krea.

Premedicinering enligt cytostatikaschema.

Före behandlingsstart: Njurfunktionskontroll (P Cystatin C eller kreatininclearance eller Iohexolclearance). Om fullgod njurfunktion kan enbart kreatinin följas vid enstaka följande kurer, men om flertal kurer skall ges eller om nedsatt njurfunktion-alternativt vid signifikant kreatininstegring skall ny njurfunktionskontroll utföras. Vid nedsatt njurfunktion individuell dosering av Cisplatin. Kontroll av audiogram innan Cisplatinbeh. Cisplatin gives med forcerad diures. Aminoglykosid skall ej givas under eller inom en månad efter Cisplatin-behandling. Om njurfunktionen är normal kan det sedan användas vid behov.

Efter kur: Antiemetikaschema nr 2.

Cykelintervall 7 dagar.

Dosreduktion:

B-LPK (x10⁹/L)	B-Neutr (x10⁹/L)	Cisplatin
>2,5	>1,0	100%