

Datum: \_\_\_\_\_

Patientdata

Kur: \_\_\_\_\_

Yta: \_\_\_\_\_

## Docetaxel/Cisplatin

(Thymom)

*OM patienten är diabetiker alternativt har predisponerande faktorer för försämrad njurfunktion, administrera Carboplatin/Docetaxel istället*

Inf Docetaxel	75 mg/m <sup>2</sup>	Dag 1
Inf Cisplatin	80 mg/m <sup>2</sup>	Dag 1
*Inj G-CSF	300 µ/ 30 ME < 70 kg	Dag 4 tom 11 (= 8 dagar) 24 tim efter avslutat cyto.
	480 µ/ 48 ME > 70 kg	

\*G-CSF kan övervägas om beh är kurativ.

**Inför kur 1:** Blodstatus, Neutr, Krea, Cystatin C och Audiometri.

**Inför varje kur:** Blodstatus, Neutr, Krea.

**Kur 1-2:** Pat övervakas avseende överkänslighetsreaktioner med upprepade kontroller av blodtryck, puls och AT. Läkare ska närvara de första 10 min av infusionstiden.

**Cykelintervall:** 21 dagar.

**Vikt x 2.** Om viktökning >2 kg ge T/Inj 40 mg Furix.

**Efter kur:** Antiemetikaschema nr 6.

**Mellandagsprover:** Blodstatus, neutr. Dag 8, 12 och 15.

Uppmana patienten att dricka ordentligt behandlingsdagen.

**DAG 1** beställs till kl \_\_\_\_\_ avvakta ja nej **Ssk.sign** **Läk.sign**

kl \_\_\_\_\_ vikt \_\_\_\_\_

**K Emend 125 mg**

**Inj Ondansetron 8 mg iv**

**Inj Betapred 8 mg iv**

**Inf NaCl 1000 ml +20mmol K. Inf.tid 1 tim**

Start

**Inf Docetaxel** \_\_\_\_\_ mg iv i 250 ml NaCl. Inf.tid 1 tim

Start

Stopp

**Inf Cisplatin** \_\_\_\_\_ mg iv i 500 ml NaCl. Inf.tid 1 tim

Start

Stopp

**Inf NaCl 1000 ml +20mmol K + 5 mmol Mg. Inf.tid 1 tim**

Start

kl \_\_\_\_\_ vikt \_\_\_\_\_ Om viktökning >2 kg ge T/Inj 40 mg Furix

**På kvällen** kl \_\_\_\_\_ **T Betapred 4 mg po**

Ca. 12 tim efter förra dosen.

**Peroral profylax**

**Ssk.sign**

**Antiemetikaschema nr 6.**

**DAG 4 -11** Se kommentar ovan.

**Ssk.sign** **Läk.sign**

\*Start av Inj G-CSF sc 300µ /30 ME

480µ /48 ME

Som skall ges 1gång/dag i 8 dagar (se ovan)

Godkänd av: \_\_\_\_\_ Läkarens underskrift: \_\_\_\_\_