

## Paclitaxel veckovis

Paclitaxel	60 mg/m <sup>2</sup>	iv inf 1 tim	Dag 1
------------	----------------------	--------------	-------

Inför varje kur: Blodstatus, Neutr.  
Premedicinering enligt cytostatikaschema.

**Kur 1-2:** Pat övervakas avseende överkänslighetsreaktioner med upprepade kontroller av blodtryck, puls och AT. Läkare ska närvara de första 10 min av infusionstiden.

**För att minska risken för akuta infusionsreaktioner skall kur 1 och 2 med Paclitaxel ges enligt följande:** Starta infusionen med hastigheten 50 ml/timme under de första 15 minuterna. Om ingen reaktion uppträder ökas infusionshastigheten sedan under påföljande 15 min till den dubbla. Om ingen reaktion uppträtt under de första 30 minuterna ges resterande mängd infusion med ordinarie hastighet.

PVC-fritt filter och aggregat!

Cykelintervall: 7 dagar  
Efter kur: Antiemetikaschema nr 1.

### Dosreduktion:

B-LPK (x10 <sup>9</sup> /L)	B-Neutr (x10 <sup>9</sup> /L)	Paclitaxel
>2,5	>1,0	100%
<2,5	<1,0	Beh uppskjutes 3-7 dagar