

Pemetrexed (Alimta) (Icke småcellig lungcancer)

Alimta	500 mg/ m ²	iv inf 10-15 min	Dag 1
Behepan	1 mg	sc	Dag 1, Var 3:e kur

Inför kur 1: Cystatin C.

Inför varje kur: Blodstatus, Neutr, Krea.

Före kur: Kortisonschema vid behandling med Alimta ges till patienten.

Premedicinering enligt cytostatikaschema.

Förbehandling med folacin (exv. T Vitaplex Mineral 1x1) och inj Behepan 1 mg im.

Behandlingen påbörjas 7 dagar före start av Alimta-behandling. Vitaplex Mineral ges sedan dagligen under hela behandlingstiden, samt 3 veckor efter avslutad behandling. Behepan-injektion upprepas var 9:e vecka, samt tom 3 veckor efter sista behandlingen.

OBS! Om nedsatt njurfunktion, GFR<45ml/min ges ej Alimta.

NSAID och salicylpreparat skall undvikas 2 dagar före tom 2 dagar efter Alimta.

Cykelintervall 21 dagar.

Utvärderingsintervall efter 4 cykler.

Efter kur: Antiemetikaschema 1.

Dosreduktion:

B-LPK (x10⁹/L)	B-TPK (x10⁹/L)	Alimta
>3,5	>100	100%
3,4-2,5	99-75	75%
≤2,4	74-50	Beh uppskjutes 3-7 dagar