

## Pemetrexed (Alimta)/Carboplatin (mesoteliom)

<b>Alimta</b>	500 mg/m <sup>2</sup>	iv inf 10-15 min	Dag 1
<b>Carboplatin</b>	AUC 5	iv inf 30 min	Dag 1
<b>Behepan</b>	1 mg	sc	Dag 1, Var 3:e kur

CALVERTS formel: Totaldos Carboplatin i mg = (GFR+25) x AUC (area under the curve)

För uträkning; se övr. dokument

Inför kur 1: Cystatin C.

Inför varje kur: Blodstatus, Neutr, Krea.

Före kur: Kortisonschema vid behandling med Alimta ges till patienten.

Premedicinering enligt cytostatikaschema.

Förbehandling med folacin (exv. T Vitaplex Mineral 1x1) och inj Behepan 1 mg im.

Behandlingen påbörjas 7 dagar före start av Alimta-behandling. Vitaplex Mineral ges sedan dagligen under hela behandlingstiden, samt 3 veckor efter avslutad behandling. Behepan-injektion upprepas var 9:e vecka, samt tom 3 veckor efter sista behandlingen.

OBS! Om nedsatt njurfunktion, GFR<45ml/min ges ej Alimta.

OM recidiv efter tidigare Carboplatinbehandling ska /skall Tavegyl 2 mg iv. ordineras. För att undvika överkänslighetsreaktion.

NSAID och salicylpreparat skall undvikas 2 dagar före tom 2 dagar efter Alimta.

Cykelintervall 21 dagar.

Utvärderingsintervall efter 3 cykler.

Efter kur: Antiemetikaschema 4.

Dosreduktion:

<b>B-LPK (x10<sup>9</sup>/L)</b>	<b>B-TPK (x10<sup>9</sup>/L)</b>	<b>Alimta</b>	<b>Carboplatin</b>
>3,0	>100	100%	100%
2,9-2,5	99-75	75%	75%
≤2,4	74-50	Beh uppskjutes 3-7 dagar	