

Datum: _____

Patientdata

Kur: _____

Yta: _____

Pemetrexed (Alimta)/Carboplatin

(Icke-småcellig lungca)

Inf Alimta	500 mg/m ²	Dag 1
Inf Carboplatin	AUC 5	
Inj Behepan	1 mg	7 dagar innan kur 1, sedan dag 1 var 3:e kur

Inför kur 1: Cystatin C.**Inför varje kur:** Blodstatus, Neutr, Krea.

Förbehandling med folacin (exv. T Vitaplex Mineral 1x1) och inj Behepan 1 mg im. Behandlingen påbörjas 7 dagar före start av Alimta-behandling. Vitaplex Mineral ges sedan dagligen under hela behandlingstiden, samt 3 veckor efter avslutad behandling. Behepan-injektion upprepas var 9:e vecka, samt tom 3 veckor efter sista behandlingen.

OBS! Om nedsatt njurfunktion, GFR<45ml/min-ges ej Alimta.

NSAID och salicylpreparat skall undvikas 2 dagar före tom 2 dagar efter Alimta.

Cykelintervall: 21 dagar.**Före kur och behandlingsdagen:** Kortisonschema vid Alimta ges till patienten.**Efter kur:** Antiemetikaschema nr 4.**1 VECKA FÖRE KUR 1: Datum** _____**Ssk.sign** **Läk.sign****Inj Behepan 1 mg im**

Peroral profylax**Ssk.sign** **Läk.sign****Kortisonschema vid behandling med Alimta**

OBS! Patienten ska ha tagit kortison enl. schema dagen innan!

DAG 1 beställs till kl _____ avvakta ja nej**Ssk sign** **Läk sign**

Inj Ondansetron 8 mg iv	} Kl _____	_____	_____
Inj/T Betapred 4 mg iv/po		_____	_____

Inj Behepan 1 mg im (ENDAST var 3:e kur!)

Inf Alimta _____ mg iv i 100 ml NaCl(9 mg/ml). Inf.tid 10– 15 min

Start _____

Vänta 15 min innan Carboplatin ges.

Stopp _____

Inf Carboplatin _____ mg iv i 500 ml Glucos 5 mg/ml Inf.tid 30 min

Start _____

Stopp _____

På kvällen kl _____ **T Betapred 4 mg po**

Ca 12 tim efter förra dosen

Peroral profylax**Ssk.sign** **Läk.sign****Antiemetikaschema nr 4.**

Godkänd av: _____ Läkarens underskrift: _____